

3. Функция  $\xi(t)$  в точке  $t = \alpha$  имеет простой полюс и  $\alpha \in D_{01}$ . Из  $D_{01}$  исключена  $D_{00}$  – малая не зависящая окрестность точки  $\alpha$  и введено обозначение  $D_{02} = D_{01} \setminus D_{00}$ . Границы  $D_{00}$  являются погранслоинными линиями;
4. Функция  $\Pi(t, \varepsilon)$  существенна только в областях  $(p(t_0)) \cup D_{1\varepsilon}$  и  $(p(T_0)) \cup D_{2\varepsilon}$  и линии  $(p(t_0)), (p(T_0))$  являются погранслоинными, а  $D_{1\varepsilon}, D_{2\varepsilon}$ -погранслоинные области;
5. Функция  $z(t, \varepsilon)$  в области  $D_{12} \cup D_{22} \cup D_{32}$  имеет порядок  $\varepsilon$ , а в  $D_{04}$  неограничена;
6. Функция  $z(t, \varepsilon)$  под влиянием полюса определяет погранслоинные линии  $(p_3)[B_3, \tilde{B}_3], (p_4)[B_6, \tilde{B}_6]$ .

#### Список литературы:

1. **Алыбаев, К.С.** Существование погранслоинных линий для линейных сингулярно возмущенных уравнений с аналитическими функциями [Текст] / К.С. Алыбаев, К.Б. Тампагаров // Актуальные проблемы теории управления, топологии и операторных уравнений: Матер. II-й межд. конф., посвящ. 20-летию КРСУ и 100-летию проф. Я.В. Быкова. – Бишкек: КРСУ, 2013. – С.83 – 88.
2. **Панков, П.С.** Явление погранслоинных линий и асимптотика решений сингулярно возмущенных линейных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями. [Текст] / П.С. Панков, К.С. Алыбаев, М.Р. Нарбаев, К.Б. Тампагаров // Вестник ОшГУ. – Ош, ОшГУ, 2013. – №1. – С. 227 - 231.
3. **Алыбаев, К.С.** Метод погранслоинных линий построения регулярных и сингулярных областей для линейных сингулярно возмущенных уравнений с аналитическими функциями [Текст] / К.С. Алыбаев, К.Б. Тампагаров // Естественные и математические науки в современном мире: сб. статей по материалам XLVII межд. научно-практ. конф. – Новосибирск: СиБАК, 2016. – №10 (45). – С. 59 - 66.
4. **Алыбаев, К.С.** Геометрическая теория сингулярно возмущенного уравнения Бернулли с точкой перевала [Текст] / К.С. Алыбаева, Ш.М. Матанов // Наука. Образование. Техника. – Ош: КУМУ, 2021. – №3. – С. 40 - 49.
5. **Евграфов, М. А.** Аналитические функции [Текст] / М.А. Евграфов. - М.: Наука, 1968.-234 с.
6. **Лаврентьев М. А.** Методы теории функций комплексного переменного [Текст] / М.А. Лаврентьев, Б. В. Шабат. - Москва: Наука, 1973. - 739 с.
7. **Федорюк, М.В.** Метод перевала [Текст] /М.В. Федорюк. - Москва: Наука, 1977.- 368с.
8. **Халматов, А.А.** Построение асимптотики решение сингулярно возмущенного уравнения в частных производных с особой линией [Текст] / А.А. Халматов, Н. Нишанбаева, А.Абсатар к. // Наука. Образование. Техника. – Ош: КУМУ, 2021. – №3. – С. 29 - 34.
9. **Халматов, А.А.** Построение асимптотики решение сингулярно-возмущенного нелинейного уравнения второго порядка с особой точкой [Текст] / А.А. Халматов, А.А. Балтабаев, Г. Каныбек к. // Наука. Образование. Техника. – Ош: КУМУ, 2021. – №3. – С. 34-40.

DOI:10.54834/16945220\_2022\_3\_22

Поступила в редакцию 05.09.2022 г.

УДК 514.75

**Матиева Г.***д.ф.-м.н., проф. Ошского государственного университета, Кыргызская Республика***Абдуллаева Ч.Х.***к.ф.-м.н, доц. Кыргызско-Узбекского Межд.универ. им Б.Сыдыкова, Кырг. Республика***Нишанбаева Н.Т.***магистрант Ошского государственного университета, Кыргызская Республика*

**$E_5$  ЕВКЛИДДИК МЕЙКИНДИГИНДЕ  $f_2^1$  БӨЛҮКТӨП ЧАГЫЛТУУСУНУН  
КВАЗИ-КОШМОК СЫЗЫКТАРЫНЫН ЖАШАШЫНЫН ЗАРЫЛ ЖАНА  
ЖЕТИШТҮҮ ШАРТТАРЫ**

Изилдөөнүн предмети катары беш ченемдүү евклиддик  $E_5$  мейкиндикти бөлүктөп чагылтуу жараяны каралат. Изилдөөнүн максаты болуп  $E_5$  мейкиндигин бөлүктөп чагылтуунун квазикошмок сызыктарынын жашашынын зарыл жана жетиштүү шарттарын табуу эсептелинет. Изилдөөлөрдө: Картандын сырткы формалар жана кыймылдуу репер методдору колдонулду. Бул жумушта евклиддик беш ченемдүү мейкиндикти бөлүктөп чагылтууга тиешелүү маселе каралган.  $\Omega \subset E_5$  аймагында ушундай жылма сызыктардын көптүгү берилген: ар бир  $X \in \Omega$  чекити аркылуу берилген көптүктүн бирден гана сызыгы өтөт. Ушул сызык үчүн Френенин репери боло тургандай кыймылдуу репер тандалып алынган. Бул репердин координаталык векторлорунун интегралдык сызыктары Френенин торчосун түзүшөт. Ушул торчонун  $\omega^2$  сызыгынын жанымасында  $F_2^1$  чекити инварианттык түрдө аныкталат.  $X$  чекити  $\Omega$  аймагында кыймылга келгенде  $F_2^1$  чекити өзүнүн  $\Omega_2^1 \subset E_5$  аймагын сызып чыгат. Натыйжада  $f_2^1(X) = F_2^1$  боло тургандай  $f_2^1: \Omega \rightarrow \Omega_2^1$  бөлүктөп чагылтуусу аныкталат. Үч ченемдүү бөлүштүрүүлөргө таандык болушкан сызыктардын  $f_2^1$  бөлүктөп чагылтуусунун квазикошмок сызыктар болушунун зарыл жана жетиштүү шарттары изилденген. Изилдөөнүн жыйынтыгында үч ченемдүү бөлүштүрүүлөргө таандык болушкан сызыктардын каралып жаткан  $f_2^1$  бөлүктөп чагылтуусу үчүн квазикошмок сызыктар болушунун зарыл жана жетиштүү шарттары табылган. Үч ченемдүү бөлүштүрүүлөргө таандык болушкан сызыктардын  $f_2^1$  бөлүктөп чагылтуусунун квазикошмок сызыктары болушунун зарыл жана жетиштүү шарттарын изилдөө макалада алгачкы ирет изилденип жаткандыктан, алынган жыйынтыктар жаңы болуп эсептелинери көрсөтүлгөн. Алынган жыйынтыктар дифференцирленүүчү чагылтуулар теориясында колдонуу үчүн сунушталат.

**Негизги сөздөр:** евклиддик мейкиндик; Френенин репери; Френенин торчосу; бөлүктөп чагылтуу; бөлүштүрүү; квазикошмок сызык.

## НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ КВАЗИДВОЙНЫХ ЛИНИЙ ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ $f_2^1$ В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ $E_5$

В данной работе рассмотрена задача, относящаяся к частным отображениям 5- мерного евклидова пространства. В области  $\Omega \subset E_5$  задано семейство гладких линий так, что через каждую точку  $X \in \Omega$  проходит одна линия заданного семейства. Выбран подвижный репер так, чтобы он был репером Френе для линии заданного семейства. Интегральные линии координатных векторных полей этого репера образуют сеть Френе. На касательной к линии  $\omega^2$  этой сети инвариантным образом определяется точка  $F_2^1$ . Когда точка  $X$  смещается в области  $\Omega$ , точка  $F_2^1$  описывает свою область  $\Omega_2^1 \subset E_5$ . Таким образом получается частичное отображение  $f_2^1: \Omega \rightarrow \Omega_2^1$  такое, что  $f_2^1(X) = F_2^1$ . Исследованы необходимые и достаточные условия для того, чтобы линии, принадлежащие трехмерным распределениям, являлись квазидвойными линиями частичного отображения  $f_2^1$ . Предметом исследования является процесс частичного отображения пятимерного евклидова пространства  $E_5$ . Цель исследования - найти необходимые и достаточные условия существования квазидвойных линий частичного отображения пространства  $E_5$ . В исследовании использовались: метод внешних форм Картана и метод подвижного репера. В результате исследования были найдены необходимые и достаточные условия существования квазидвойных линий для рассматриваемого частичного отображения  $f_2^1$  линий, принадлежащих трехмерным распределениям. Исследования необходимых и достаточных условий для того, чтобы линии, принадлежащие трехмерным распределениям, являлись квазидвойными линиями частичного отображения  $f_2^1$  рассмотрено впервые, поэтому полученные результаты являются новыми. Полученные результаты рекомендуется для использования в теории дифференцируемых отображений

**Ключевые слова:** евклидово пространство; репер Френе; сеть Френе; частичное отображение; распределение; квазидвойная линия.

## NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS FOR EXISTENCE OF A QUASIDOUBLE LINE OF A THE PARTIAL MAPPING $f_2^1$ IN SPACE $E_5$

It is considered the problem related to partial mapping of 5-dimensional Euclidean space  $E_5$ . A family of smooth lines is given in the domain  $\Omega \subset E_5$  so that through each point  $X \in \Omega$  passes one line of a given family. A movable frame is chosen so that it was Frenet's frame for the line of the given family. The integral lines of the coordinate vectors fields of this frame form a Frenet's net. On a tangent to the line  $\omega^2$  of this net a point  $F_2^1$  is defined in an invariant way. When the point  $X$  moves in the domain  $\Omega$  the point  $F_2^1$  describes its domain  $\Omega_2^1 \subset E_5$ . In this way we get a partial mapping  $f_2^1: \Omega \rightarrow \Omega_2^1$  such that  $f_2^1(X) = F_2^1$ . The necessary and sufficient conditions for the lines belonging to 3-dimensional distributions, were quasi-double lines of the partial mapping  $f_2^1$ . The subject of research is the process of partial mapping of the five-dimensional Euclidean space  $E_5$ . The purpose of the study is to find the necessary and sufficient conditions for the existence of quasi-double

lines of a partial space mapping  $f_2^1$ . The study used: the method of external forms of Cartan and the method of moving reper. As a result of the study, necessary and sufficient conditions for the existence of quasi-double lines for the considered partial mapping of lines belonging to three-dimensional distributions were found. The study of necessary and sufficient conditions for lines belonging to three-dimensional distributions to be quasi-double lines of a partial mapping  $f_2^1$  is considered for the first time, so the results obtained are new. The results obtained are recommended for use in the theory of differentiable mappings.

**Key words:** Euclidean space; Frenet frame; net of Frenet; partial mapping; distribution; quasi-double line.

**Киришүү.**  $\Omega \subset E_5$  мейкиндигинин  $\Omega$  аймагында ушундай жылма сызыктардын көптүгү берилген  $X \in \Omega$  ар бир чекити аркылуу берилген көптүктүн бирден гана сызыгы өтөт. Орто нормаланган  $\mathfrak{R} = (X, \vec{e}_i)$  ( $i, j, k = \overline{1,5}$ ) реперин  $\Omega$  аймагында бул репер берилген көптүктүн  $\omega^l$

сызыгы үчүн Френенин реperi [1], [2] боло тургандай тандап алабыз.  $\mathfrak{R}$  реперинин деривациондук формулалары төмөнкүдөй көрүнүштө болушат:

$$d\vec{X} = \omega^i \vec{e}_i, \quad d\vec{e}_i = \omega_i^k \vec{e}_k. \quad (1)$$

Мындагы  $\omega^i, \omega_i^k$  дифференциалдык формалары евклиддик мейкиндиктин структуралык теңдемелерин канааттандырышат:

$$D\omega^i = \omega^k \wedge \omega_k^i, \quad D\omega_i^k = \omega_i^j \wedge \omega_j^k, \quad \omega_i^i + \omega_j^j = 0. \quad (2)$$

$\vec{e}_i$  вектордук талааларынын интегралдык сызыктары берилген көптүктүн  $\omega^l$  сызыгы үчүн Френенин торчосун [1]  $\Sigma_5$  түзүшөт.  $\mathfrak{R}$  реperi  $\Sigma_5$  торчосунун сызыктарынын жанымаларына тургузулгандыктан,  $\omega_i^k$  формалары башкы формалар болушат, б.а.

$$\omega_i^k = \Lambda_j^k \omega^j. \quad (3)$$

(2) формулалардын акыркы барабардыгын эске алсак, анда төмөндөгү келип чыгат:

$$\Lambda_j^k = -\Lambda_k^j. \quad (4)$$

(3) барабардыкты сырттан дифференцирлеп төмөндөгүнү алабыз:

$$D\omega_i^k = d\Lambda_j^k \wedge \omega^j + \Lambda_j^k D\omega^j.$$

Мындан, (2) формуланы колдонсок, төмөндөгү келип чыгат:

$$\omega_i^j \wedge \omega_j^k = d\Lambda_{ij}^k \wedge \omega^j + \Lambda_{ij}^k \wedge \omega^l \wedge \omega_l^j.$$

(3) формуланын негизинде акыркы барабардык төмөндөгүдөй көрүнүшкө келет:

$$\omega_i^j \wedge \Lambda_{j\ell}^k \omega^\ell = d\Lambda_{ij}^k \wedge \omega^j - \Lambda_{ij}^k \omega_l^j \wedge \omega^\ell$$

же

$$\Lambda_{j\ell}^k \omega_i^j \wedge \omega^\ell = d\Lambda_{ij}^k \wedge \omega^j - \Lambda_{ij}^k \wedge \omega_l^j \wedge \omega^\ell.$$

(барабардыктын оң жагындагы экинчи мүчөдө жана индекстеринин ордун алмаштырдык). Мындан төмөндөгүнү алабыз:

$$d\Lambda_{ij}^k \wedge \omega^j - \Lambda_{i\ell}^k \omega_j^\ell \wedge \omega^j - \Lambda_{j\ell}^k \omega_i^j \wedge \omega^\ell = 0$$

же

$$(d\Lambda_{ij}^k - \Lambda_{i\ell}^k \omega_j^\ell - \Lambda_{j\ell}^k \omega_i^j) \wedge \omega^j = 0.$$

Акыркы барабардыкка Картандын леммасын [3] колдонуп төмөндөгүгө ээ болобуз:

$$d\Lambda_{ij}^k - \Lambda_{i\ell}^k \omega_j^\ell - \Lambda_{j\ell}^k \omega_i^j = \Lambda_{ijm}^k \omega^m$$

же

$$d\Lambda_{ij}^k = (\Lambda_{ijm}^k + \Lambda_i^k \Lambda_{jm}^l + \Lambda_j^k \Lambda_{im}^l) \omega^m. \quad (5)$$

Чондуктардын  $\{\Lambda_{ij}^k, \Lambda_{ijm}^k\}$  системасы экинчи тартиптеги геометриялык объекти

түзүшөт.

Берилген көптүктүн  $\omega^l$  сызыгы үчүн Френенин формулалары төмөндөгүдөй көрүнүштө болушат:

$$\begin{aligned} d_1 \vec{e}_1 &= \Lambda_1^2 \vec{e}_2, \\ d_1 \vec{e}_2 &= \Lambda_2^1 \vec{e}_1 + \Lambda_2^3 \vec{e}_3, \\ d_1 \vec{e}_3 &= \Lambda_3^2 \vec{e}_2 + \Lambda_3^4 \vec{e}_4, \\ d_1 \vec{e}_4 &= \Lambda_4^3 \vec{e}_3 + \Lambda_4^5 \vec{e}_5, \\ d_1 \vec{e}_5 &= \Lambda_5^4 \vec{e}_4, \end{aligned}$$

$$\text{жана } \Lambda_1^3 = -\Lambda_1^3 = 0, \quad \Lambda_1^4 = -\Lambda_4^1 = 0, \quad \Lambda_1^5 = -\Lambda_5^1 = 0 \quad (6)$$

$$\Lambda_2^5 = -\Lambda_5^2 = 0, \quad \Lambda_2^4 = -\Lambda_4^2 = 0, \quad \Lambda_3^5 = -\Lambda_5^3 = 0. \quad (7)$$

мындагы  $k_1^l = \Lambda_{1l}^2$ ,  $k_2^l = \Lambda_{2l}^3$ ,  $k_3^l = \Lambda_{3l}^4$ ,  $k_4^l = \Lambda_{4l}^5 = -\Lambda_5^l$  -  $\omega^l$  сызыгынын биринчи,

экинчи, үчүнчү жана төртүнчү ийриликтери (тиешелеш түрдө),  $d_1$  -  $\omega^l$  сызыгы боюнча дифференцирлөөнүн символу.

$\Sigma_5$  торчосунун  $\omega^l$  сызыгынын жанымасындагы  $F_i^j$  ( $i \neq j$ ) псевдофокусу төмөндөгүдөй

радиус – вектор менен аныкталат:

$$\vec{F}_i^j = \vec{X} - \frac{1}{\Lambda_j^i} \vec{e}_i = \vec{X} + \frac{1}{\Lambda_j^i} \vec{e}_i. \quad (8)$$

Ар бир  $(X, \vec{e}_i)$  жанымасында төрттөн псевдофокус жашайт:

$$(X, \vec{e}_1) \text{ жанымасында } - F_1^2, F_1^3, F_1^4, F_1^5,$$

$$(X, \vec{e}_2) \text{ жанымасында } - F_2^1, F_2^3, F_2^4, F_2^5,$$

$$(X, \vec{e}_3) \text{ жанымасында } - F_3^1, F_3^2, F_3^4, F_3^5,$$

$$(X, \vec{e}_4) \text{ жанымасында } - F_4^1, F_4^2, F_4^3, F_4^5,$$

$$(X, \vec{e}_5) \text{ жанымасында } - F_5^1, F_5^2, F_5^3, F_5^4.$$

$\Omega \subset E_5$  аймагындагы  $\Sigma_5$  торчосу Френенин циклдик торчосу деп аталат, эгерде төмөндөгү реперлер бир учурда  $\omega^1, \omega^2, \omega^3, \omega^4, \omega^5$  сызыктары үчүн (тиешелеш түрдө) Френенин реперлери болушса:  $\mathfrak{R}_1 = (X, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4, \vec{e}_5)$ ,  $\mathfrak{R}_2 = (X, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4, \vec{e}_5, \vec{e}_1)$ ,

$$\mathfrak{R}_3 = (X, \vec{e}_3, \vec{e}_4, \vec{e}_5, \vec{e}_1, \vec{e}_2), \quad \mathfrak{R}_4 = (X, \vec{e}_4, \vec{e}_5, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3), \quad \mathfrak{R}_5 = (X, \vec{e}_5, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4).$$

$\Sigma_5$  торчосу Френенин циклдик торчосу болсун деп эсептейли жана аны  $\tilde{\Sigma}_5$  көрүнүшүндө

белгилейбиз.

**Изилдөөнүн материалдары.**

$F_2^l \in (X, \vec{e}_2)$  псевдофокусу төмөндөгүдөй радиус – вектор менен аныкталат:

$$\vec{F}_2^l = \vec{X} - \frac{l}{\Lambda_2^l} \vec{e}_2 = \vec{X} + \frac{l}{\Lambda_2^l} \vec{e}_2. \quad (9)$$

$X$  чекити  $\Omega \subset E_5$  аймагында кыймылга келгенде  $F_2^l$  псевдофокусу өзүнүн  $\Omega_2^l \subset E_5$  аймагын “сызып” чыгат. Натыйжада  $f_2^l(X) = F_2^l$  боло тургандай  $f_2^l : \Omega \rightarrow \Omega_2^l$  бөлүктөп чагылтуусуна ээ болобуз.

(9) барабардыкты дифференцирлейбиз:

$$d\vec{F}_2^l = d\vec{X} - d\left(\frac{l}{\Lambda_{21}^l}\right)\vec{e}_2 - \frac{l}{\Lambda_{21}^l} d\vec{e}_2$$

Мындан (1), (2), (3), (5) формулаларын эске алып, төмөндөгүгө ээ болобуз:

$$d\vec{F}_2^l = \omega^m \vec{e}_m + \frac{A_{21m}^l \omega^m}{(\Lambda_{21}^l)^2} \vec{e}_2 - \frac{l}{\Lambda_{21}^l} \Lambda_{2m}^i \omega^m \vec{e}_i,$$

мында  $d\Lambda_{21}^l = (\Lambda_{21m}^l + \Lambda_{2\ell}^5 \Lambda_{1m}^\ell + \Lambda_{\ell 1}^1 \Lambda_{2m}^\ell) \omega^m = A_{21m}^l \omega^m$ .

$d\vec{F}_2^l$  векторун төмөндөгүдөй жазабыз:

$$\begin{aligned} d\vec{F}_2^l = & \left[ \vec{e}_1 + \frac{A_{211}^l}{(\Lambda_{21}^l)^2} \vec{e}_2 - \frac{\Lambda_{21}^i}{\Lambda_{21}^l} \vec{e}_i \right] \omega^1 + \left[ \vec{e}_2 + \frac{A_{212}^l}{(\Lambda_{21}^l)^2} \vec{e}_2 - \frac{\Lambda_{22}^i}{\Lambda_{21}^l} \vec{e}_i \right] \omega^2 + \\ & + \left[ \vec{e}_3 + \frac{A_{213}^l}{(\Lambda_{21}^l)^2} \vec{e}_2 - \frac{\Lambda_{23}^i}{\Lambda_{21}^l} \vec{e}_i \right] \omega^3 + \left[ \vec{e}_4 + \frac{A_{214}^l}{(\Lambda_{21}^l)^2} \vec{e}_2 - \frac{\Lambda_{14}^i}{\Lambda_{21}^l} \vec{e}_i \right] \omega^4 + \\ & + \left[ \vec{e}_5 + \frac{A_{215}^l}{(\Lambda_{21}^l)^2} \vec{e}_2 - \frac{\Lambda_{25}^i}{\Lambda_{21}^l} \vec{e}_i \right] \omega^5. \end{aligned}$$

$\tilde{\Sigma}_5$  торчосу Френенин циклдик торчосу экендигин эске алсак, анда  $d\vec{F}_2^l = \omega^i \vec{a}_i$ , мында

$\vec{a}_i$  төмөндөгүдөй көрүнүшкө ээ болушат:

$$\begin{aligned} \vec{a}_1 &= \frac{A_{211}^l}{(\Lambda_{21}^l)^2} \vec{e}_2 - \frac{\Lambda_{21}^3}{\Lambda_{15}^5} \vec{e}_3; \\ \vec{a}_2 &= \left[ 1 + \frac{A_{212}^l}{(\Lambda_{21}^l)^2} \right] \vec{e}_2 - \frac{\Lambda_{22}^3}{\Lambda_{21}^1} \vec{e}_3; \\ \vec{a}_3 &= -\frac{\Lambda_{23}^1}{\Lambda_{21}^1} \vec{e}_1 + \frac{A_{213}^l}{(\Lambda_{21}^l)^2} \vec{e}_2 + \vec{e}_3; \\ \vec{a}_4 &= -\frac{\Lambda_{21}^4}{\Lambda_{21}^1} \vec{e}_1 + \frac{A_{214}^l}{(\Lambda_{21}^l)^2} \vec{e}_2 - \frac{\Lambda_{24}^3}{\Lambda_{21}^1} \vec{e}_3 + \vec{e}_4; \\ \vec{a}_5 &= -\frac{\Lambda_{25}^1}{\Lambda_{21}^1} \vec{e}_1 + \frac{A_{215}^l}{(\Lambda_{21}^l)^2} \vec{e}_2 - \frac{\Lambda_{25}^3}{\Lambda_{21}^1} \vec{e}_3 + \vec{e}_5 \end{aligned} \quad (10)$$

$\Delta_{(123)} = (X, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $\ell$  сызыгын карайбыз. Анын жаныма вектору  $\vec{\ell} = \ell^1 \vec{e}_1 + \ell^2 \vec{e}_2 + \ell^3 \vec{e}_3$  болот

$$f_2^1(\ell) = \vec{\ell} \text{ сызыгынын жаныма векторун } \vec{\ell} = \ell^1 \vec{a}_1 + \ell^2 \vec{a}_2 + \ell^3 \vec{a}_3 \text{ көрүнүшүндө}$$

издейбиз. (10) формулаларды эске алсак төмөндөгү келип чыгат:

$$\vec{\ell} = (\ell^1 a_1^2 + \ell^2 a_2^2 + \ell^3 a_3^2) \vec{e}_2 + \ell^3 a_3^1 \vec{e}_1 + (\ell^1 a_1^3 + \ell^2 a_2^3) \vec{e}_3.$$

$\vec{\ell}, \vec{\ell}, \overrightarrow{XF_2^1} \in \Delta_{(123)}$  шарты аткарылат экен. Демек,  $\ell$  сызыгы ар дайым  $(f_2^1, \Delta_{(123)})$

түгөйүнүн квазигошмок сызыгы болот экен.

$\Delta_{(124)} = (X, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_4)$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $m$  сызыгын карайлы. Анын жаныма вектору  $\vec{m} = m^1 \vec{e}_1 + m^2 \vec{e}_2 + m^4 \vec{e}_4$  болот.  $\vec{m} = f_2^1(m)$  сызыгынын жаныма вектору

төмөндөгүдөй боло тургандыгын (жогорудагыга окшош эле) жеңил эле көрсөтүүгө болот:

$$\vec{m} = m^4 a_4^1 \vec{e}_1 + (m^1 a_1^2 + m^2 a_2^2 + m^4 a_4^2) \vec{e}_2 + (m^1 a_1^3 + m^2 a_2^3 + m^4 a_4^3) \vec{e}_3 + m^4 \vec{e}_4.$$

$\vec{m}, \vec{m}, \overrightarrow{XF_2^1} \in \Delta_{(124)}$  шартынан төмөндөгү келип чыгат:

$$m^1 a_1^3 + m^2 a_2^3 + m^4 a_4^3 = 0.$$

Мындан (10) формулаларды эске алуу менен төмөндөгүнү алабыз:

$$\Lambda_{21}^3 m^1 + \Lambda_{22}^3 m^2 - \Lambda_{24}^3 m^4 = 0 \tag{11}$$

Тескерисинче, эгерде (11) шарты орун алса, анда  $\Delta_{(124)}$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $m$  сызыгы  $(f_2^1, \Delta_{(124)})$  түгөйүнүн квазигошмок сызыгы болот.

Жогорудагыга окшош эле  $\Delta_{(125)}$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $k$  сызыгын карайбыз. Анын жаныма вектору  $\vec{k} = k^1 \vec{e}_1 + k^2 \vec{e}_2 + k^5 \vec{e}_5$  болот.  $\vec{k} = f_2^1(k)$  сызыгынын жаныма векторун  $\vec{k} = k^1 \vec{a}_1 + k^2 \vec{a}_2 + k^5 \vec{a}_5$  көрүнүшүндө издейбиз. (10) формулаларды эске алып,

төмөндөгүгө ээ болобуз:

$$\vec{k} = k^5 a_5^1 \vec{e}_1 + (k^1 a_1^2 + k^2 a_2^2 + k^5 a_5^2) \vec{e}_2 + (k^1 a_1^3 + k^2 a_2^3 + k^5 a_5^3) \vec{e}_3 + k^5 \vec{e}_5.$$

$\vec{k}, \vec{k}, \overrightarrow{XF_2^1} \in \Delta_{(125)}$  шартынан төмөндөгүнү алабыз:

$$k^1 \Lambda_{21}^3 + k^2 \Lambda_{22}^3 - k^5 \Lambda_{25}^3 = 0 \tag{12}$$

мында  $\Lambda_{21}^3 - \tilde{\Sigma}_5$  торчосунун  $\omega^1$  сызыгынын экинчи ийрилиги;  $\Lambda_{22}^3$  – ушул торчонун  $\omega^2$  сызыгынын биринчи ийрилиги;  $\Lambda_{25}^3 = np_{e_3} \vec{\Lambda}_{25}$ ,  $\vec{\Lambda}_{25} = d_5 \vec{e}_2$ .

Тескерисинче, эгерде (12) шарты орун алса, анда  $\Delta_{(125)}$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $k$  сызыгы  $(f_2^1, \Delta_{(125)})$  түгөйүнүн квазигошмок сызыгы болот.

Ошентип,  $\Delta_{(125)}$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $k$  сызыгы  $(f_2^1, \Delta_{(125)})$  түгөйүнүн квазигошмок сызыгы болушу үчүн (б) шартынын орун алышы зарыл жана жетиштүү.

Эми  $\Delta_{(135)}$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $h$  сызыгын карайбыз. Анын жаныма вектору  $\vec{h} = h^1 \vec{e}_1 + h^3 \vec{e}_3 + h^5 \vec{e}_5$  болот.  $\vec{h} = f_2^1(h)$  сызыгынын жаныма векторун  $\vec{h} = h^1 \vec{a}_1 + h^3 \vec{a}_3 + h^5 \vec{a}_5$  көрүнүшүндө издейбиз. (10) формулаларды эске алып,

төмөндөгүгө ээ болобуз:

$$\vec{h} = (h^3 a_3^1 + h^5 a_5^1) \vec{e}_1 + (h^1 a_1^2 + h^3 a_3^2 + h^5 a_5^2) \vec{e}_2 + (h^1 a_1^3 + h^3 a_3^3 + h^5 a_5^3) \vec{e}_3 + h^5 \vec{e}_5.$$

$\vec{h}, \vec{h}, \vec{XF}_2^1 \in \Delta_{(135)}$  шартынан:

$$h^1 a_1^2 + h^3 a_3^2 - h^5 a_5^2 = 0$$

келип чыгат, мында  $a_i^j - \vec{a}_i$  векторунун  $j$  координатасы. (10) формулаларды эске алып,

акыркы барабардыктан төмөндөгүнү алабыз.

$$h^1 A_{211}^1 + h^3 A_{213}^1 + h^5 A_{215}^1 = 0. \quad (13)$$

Тескерисинче, эгерде (13) шарты орун алса, анда  $\Delta_{(135)}$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $h$  сызыгы  $(f_2^1, \Delta_{(135)})$  түгөйүнүн квазикошмок сызыгы болот.

#### Жыйынтыктар:

Жогорудагы изилдөөлөрдүн негизинде төмөндөгүдөй теорема далилденди.

- 1)  $\Delta_{(124)}$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $m$  сызыгы  $(f_2^1, \Delta_{(124)})$  бөлүктөп чагылтуусунун (демек,  $f_2^1$  бөлүктөп чагылтуусунун да) квазикошмок сызыгы болушу үчүн (11) шартынын орун алышы зарыл жана жетиштүү;
- 2)  $\Delta_{(125)}$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $k$  сызыгы  $f_2^1$  бөлүктөп чагылтуусунун (демек,  $(f_2^1, \Delta_{(124)})$  түгөйүнүн) квазикошмок сызыгы болушу үчүн (12) шарт орун алышы зарыл жана жетиштүү;
- 3)  $\Delta_{(135)}$  бөлүштүрүүсүнө таандык болгон  $h$  сызыгы  $f_2^1$  бөлүктөп чагылтуусунун (демек,  $(f_2^1, \Delta_{(125)})$  түгөйүнүн) квазикошмок сызыгы болушу үчүн (13) шартынын орун алышы зарыл жана жетиштүү.

#### Адабияттардын тизмеси:

1. Рашевский, П.К. Риманова геометрия и тензорный анализ [Текст] / П.К. Рашевский. – М.: Наука, 1967. – С. 481-482.
2. Схоутен, И.А. Введение в новые методы дифференциальной геометрии [Текст] / И.А. Схоутен, Д.Дж. Стройк. – М.: ИЛ, 1948. – Т. 2. – 348 с.
3. Фиников, С.П. Метод внешних форм Картана в дифференциальной геометрии [Текст] / С.П. Фиников. – М-Л.: Гостехиздат, 1948. – 432 с.
4. Базылев, В.Т. О многомерных сетях в евклидовом пространстве [Текст] / В.Т. Базылев // Литовский математический сборник. – 1966. - № 4. – С. 475-491.
5. Матиева, Г. Геометрия частичных отображений, сетей и распределений евклидова пространства [Текст]: монография / Г. Матиева. – Ош, 2003. – С. 212-219.
6. Базылев, В.Т. О фундаментальных объектах плоских многомерных сетей [Текст] / В.Т. Базылев // Известия ВУЗов Математика. – 1967. – С. 3-11.
7. Абдуллаева, Ч.Х. Евклиддик мейкиндигинде  $(f_2^1, \Delta_4)$  түгөйүнүн квази-кошмок сызыгынын жа-

- шашынын зарыл жана жетиштүү шарттары [Текст] / [Ч.Х. Абдуллаева, М.Х. Абдулазизова, Б.Т. Адиева и др.] // Наука. Образование. Техника. – Ош: КУМУ, 2021. - №2. – С. 13- 20.
8. **Абдуллаева, Ч.Х.** Төрт ченемдүү  $E_4$  евклидик мейкиндикте  $(f, D_3)$  түгөйүнүн квазикошмок сызыктарынын жашашы жөнүндө [Текст] / [Ч.Х. Абдуллаева, Ч.А. Мустапакулова, Ж. Алимova и др.] // Наука. Образование. Техника. – Ош: КУМУ, 2022. - № 1. – С. 52- 58.
9. **Абдуллаева, Ч.Х.** Необходимое и достаточное условия неподвижности координатных прямых в частичном отображении трехмерного евклидова пространства... [Текст] / [Ч.Х. Абдуллаева, К. Жамшитбек кызы, К. Элчибек уулу] // Наука. Образование. Техника. – Ош: КУУ, 2019. - №1. – С. 35-40.
10. **Абдуллаева, Ч.Х.** О существовании неподвижных прямых в частичном отображении трехмерного евклидова пространства [Текст] / [Ч.Х. Абдуллаева, К. Жамшитбек кызы, О.М. Кенжаев] // Наука. Образование. Техника. – Ош: КУУ, 2019. - №1. – С. 31-35.

DOI:10.54834/16945220\_2022\_3\_32

Поступила в редакцию 20.05.2022 г.

УДК 514.75

**Матиева Г.***д. ф.-м.н., проф. Ошского государственного университета, Кыргызская Республика***Абдуллаева Ч.Х.***к. ф.-м.н, доц. Кырг.-Узб. Межд. универ. им. Б. Сыдыкова, Кыргызская Республика***Рустамова Н.О.***магистрант Ошского государственного университета, Кыргызская Республика*

### **$E_5$ ЕВКЛИДДИК МЕЙКИНДИГИНДЕ $f_5^4$ БӨЛҮКТӨП ЧАГЫЛТУУСУНУН КВАЗИКОШМОК СЫЗЫКТАРЫНЫН ЖАШАШЫ ЖӨНҮНДӨ**

Изилдөөнүн предмети катары беш ченемдүү евклидик  $E_5$  мейкиндикти бөлүктөп чагылтуу жараяны каралат. Изилдөөнүн максаты болуп  $E_5$  мейкиндигин бөлүктөп чагылтуунун квазикошмок сызыктарынын жашашынын зарыл жана жетиштүү шарттарын табуу эсептелинет. Изилдөөлөрдө: Картандын сырткы формалар жана кыймылдуу репер методдору колдонулду. Бул жумушта евклидик беш ченемдүү мейкиндикти бөлүктөп чагылтууга тиешелүү маселе каралган.  $\Omega \subset E_5$  аймагында ушундай жылма сызыктардын көптүгү берилген: ар бир  $X \in \Omega$  чекити аркылуу берилген көптүктүн бирден гана сызыгы өтөт. Ушул сызык үчүн Френенин реperi боло тургандай кыймылдуу репер тандалып алынган. Бул репердин координаталык векторлорунун интегралдык сызыктары Френенин торчосун түзүшөт. Ушул торчонун  $\omega_2$  сызыгынын жанымасында  $F_5^4$  чекити инварианттык түрдө аныкталат.  $X$  чекити  $\Omega$  аймагында кыймылга келгенде  $F_5^4$  чекити өзүнүн  $\Omega_5^4 \subset E_5$  аймагын сызып чыгат. Натыйжада  $f_5^4(X) = F_5^4$  болгон  $f_5^4: \Omega \rightarrow \Omega_5^4$  бөлүктөп чагылтуусу аныкталат. Үч ченемдүү бөлүштүрүүлөргө таандык болушкан сызыктардын  $f_5^4$  бөлүктөп чагылтуусунун квазикошмок сызыктар болушунун зарыл жана жетиштүү шарттары изилденген. Изилдөөнүн жыйынтыгында үч ченемдүү бөлүштүрүүлөргө таандык болушкан сызыктардын каралып жаткан  $f_5^4$  бөлүктөп чагылтуусу үчүн квазикошмок сызыктар болушунун зарыл жана жетиштүү шарттары табылган. Үч ченемдүү бөлүштүрүүлөргө таандык болушкан сызыктардын  $f_5^4$  бөлүктөп чагылтуусунун квазикошмок сызыктары болушунун зарыл жана жетиштүү шарттарын изилдөө макалада алгачкы ирет изилденип жаткандыктан, алынган жыйынтыктар жаңы болуп эсептелинери көрсөтүлгөн. Алынган жыйынтыктар дифференцирленүүчү чагылтуулар теориясында колдонуу үчүн сунушталат.

**Негизги сөздөр:** евклидик мейкиндик; Френенин реperi; Френенин торчосу; бөлүктөп чагылтуу; бөлүштүрүү; квазикошмок сызык.

### **О СУЩЕСТВОВАНИИ КВАЗИДВОЙНЫХ ЛИНИЙ ЧАСТИЧНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ $f_5^4$ В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ $E_5$**

В данной работе рассмотрена задача, относящаяся к частным отображениям 5- мерного евклидова пространства. В области  $\Omega \subset E_5$  задано семейство гладких линий так, что через каждую точку  $X \in \Omega$  проходит одна линия заданного семейства. Выбран подвижный репер так, чтобы он был репером Френе для линии заданного семейства. Интегральные линии координатных векторных полей этого репера образуют сеть Френе. На касательной к линии  $\omega^2$  этой сети инвариантным образом определяется точка  $F_5^4$ . Когда точка  $X$  смещается в области  $\Omega$ , точка  $F_5^4$  описывает свою область